

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 16.07.2025/13677

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kurşuni kof (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	7 gün
	Çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	200 ml/da	10 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 ml/100 L su	21 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/da	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇ NORMU:

Etiketle yer alan ilgili ürünlere ait ilaç normu değerleri için Entegre Mücadele Teknik Talimatları esas alınmıştır. Patates tarlalarındaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans olarak 15-50 l/da, alınabilir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) Kurşuni Kof: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalı, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamalara devam edilmelidir.

Domates (Sera) Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Uygulama domates fidelerinin dikiminden hemen sonra damlama sulama ile yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü uygulamaya 15 gün aralıklarla devam edilmelidir. Uygulamadan önce damlama sulama sistemiyle 15 dakika boyunca temiz sulama yapılmalı daha sonra bitki koruma ürünü ilave edilmiş su bitene kadar uygulamaya devam edilmelidir. Uygulamadan sonra 5 dakika temiz su verilmelidir.

Elma Karalekesi: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır), ikinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde), üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 döktükten sonra, dördüncü ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.

Erken uyarı istasyonlarının bulunduğu alanlarda yerel duyurulara uyulmalıdır.

Patates Mildiyö: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak 7-10 gün ara ile uygulamalara devam edilmelidir. BOFOR 500 SC adlı bitki koruma ürünü ile bir üretim sezonunda en fazla 3 uygulama yapılmalıdır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

BOFOR 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C5:29	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	-------------------------

500 g/L Fluazinam

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır.
Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Soluması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun.
Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Zühal TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fluazinam, Monopropilen Glikol



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361D: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P261: Tozunu/dumanını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Öretim Testiş Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Topraklı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 80 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Ticaret Sic. No: 16 30810 Anadoluhisari Bölgesi/İST. Yenikapı Y.D. 308018308
Mev. Sic. No: 48-8
Antalya Tic. Sic. No: 42447
Antalya 2. Sulu Tic. Sic. No: 106272
Antalya 3. Sulu Tic. Sic. No: 106938
Gıda Tic. Sic. No: 20710
Mev. Sic. No: 030200180600011
Mev. Sic. No: 030200180600015
Mev. Sic. No: 030200180600012
Mev. Sic. No: 030200180600013
Mev. Sic. No: 030200180600014

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BOFOR 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C5:29 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BOFOR 500 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C5:29 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırarak kullanılması tavsiye edilmez.

BOFOR 500 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

BOFOR 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C5:29	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	----------------------------

500 g/L Fluazinam

DOĞALKİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İşletme St. No:16 34810 Anadoluhisar Başkent/İST. Yürütme Y.D. : 3020010001
Mikros Tic.Sic.No : 48-8 Mikros No : 0302001800000001
Anadoluhisar Tic.Sic.No : 42447 Mikros No : 03020018000000015
Anadoluhisar 2 Şube Tic.Sic.No : 180272 Mikros No : 03020018000000012
Anadoluhisar 3 Şube Tic.Sic.No : 100930 Mikros No : 03020018000000013
Gıda ve Şişme Tic.Sic.No : 28710 Mikros No : 03020018000000014



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Zülal TÜRKİŞEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager

16 Temmuz 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü



2025 AİLE YILI

Sayı : E-81466379-320.04.02-20422928

04.08.2025

Konu : BOFOR 500 SC - Emsal Ruhsat HK.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNE
TOPLARÖNÜ SOK.NO.16 BEYKOZ / İSTANBUL

Firmanız adına emsal ruhsat başvurusunda bulunulan BOFOR 500 SC (500 g/l Fluzinam) isimli bitki koruma ürününün ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmış olup Genel Müdürlüğünüz onaylı ruhsat ve etiket belgesi yazınız ekinde gönderilmektedir. Etiket üzerinde yapılan düzenlemenin dikkate alınması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Osman ARI
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek:

1 - Ruhsat ve Etiket (3 Sayfa)

2 - .

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 36CDEA91-73BA-4DE3-830D-C440CF3E4711

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Tödiumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Çiğdem ATAMAN

Mühendis

