

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 07.07.2021 / 11973

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

| Bitki Adı      | Zararlı Organizma Adı                                          | Uygulama Dozu   | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Biber (Sera)   | Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )         | 125 ml/100 L su | 3 gün                                  |
| Domates (Sera) | Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )         | 125 ml/100 L su | 3 gün                                  |
| Hıyar (Sera)   | Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )        | 100 ml/100 L su | 3 gün                                  |
| Buğday         | Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )                   | 75 ml/da        | 56 gün                                 |
|                | Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )                       |                 |                                        |
|                | Septoria yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )             |                 |                                        |
| Antepfıstığı   | Antepfıstığında karazenk ( <i>Pseudocercospora pistacina</i> ) | 75 ml/100 L su  | 21 gün                                 |
| Fındık         | Fındıkta külleme ( <i>Erysiphe corylacearum</i> )              | 100 ml/100 L su | 28 gün                                 |

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Domates (Sera) ve Biber (Sera) patlıcangillerde külleme:** Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

**Hıyar (Sera) kabakgillerde külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir.

**Buğdayda tahıl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyrini izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Buğdayda sarı pas:** Erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20 °C sıcaklık) hastalığın seyrini izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**BOND 320 SC**

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

| Grubu | G1:3 | C3:11 | Fungisit (Mantar İlacı) |
|-------|------|-------|-------------------------|
|-------|------|-------|-------------------------|

**200 g/L Tebuconazole + 120 g/L Azoxystrobin**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

**Deri ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

**Soluması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

**Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

**ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**



**Özül TÜRKMEN**  
Ruhsatlandırma Müdürü  
Registration Manager

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Tebuconazole, Azoxystrobin, Monopropilen glikol



**DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P280: Korumacı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH0401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

**DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!**

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR**

**SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Topraklı Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 368 65 87 - 90 Fax: (0216) 368 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Teplirini St. No:16 34810 Anadoluhisarı Beykoz/İST. Yenkaygı Y.N.:3020018018  
Mersis No : 0302001800000011  
Antalya Tic.Sic.No : 42447 Mersis No : 0302001800000015  
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No : 108272 Mersis No : 0302001800000012  
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No : 108938 Mersis No : 0302001800000013  
Sakarya Şubesi Tic.Sic.No : 20710 Mersis No : 0302001800000014

29 Ocak 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

**Buğdayda septorya yaprak lekesi:** Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıkça ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

**Antepfıstığında karazenk:** Birinci uygulama koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yaprakların tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir. İkinci ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır.

**Fındıkta küleme:** Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş bahçelerde ise ilk uygulama fındık dalları meyve (çotanak) büyütme dönemindeyken yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer uygulamalara 10-14 gün aralıklarla devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**BOND 320 SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BOND 320 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 / C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR**  
**SAN. VE TİC. A. Ş.**

**BOND 320 SC**

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

|       |      |       |                            |
|-------|------|-------|----------------------------|
| Grubu | G1:3 | C3:11 | Fungisit<br>(Mantar İlacı) |
|-------|------|-------|----------------------------|

**200 g/L Tebuconazole + 120 g/L Azoxystrobin**

#### DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Taahhüt Şiş. No: 16 34810 Anadolu İlaçları / ST. Yoluyla YD: 3020018001  
Mevlânâ Tic. Sic. No: 48-8 Mersis No: 03020018000001  
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 42447 Mersis No: 03020018000005  
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 100272 Mersis No: 03020018000012  
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 100938 Mersis No: 03020018000013  
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 26710 Mersis No: 03020018000014



**Züla TÜRKMEN**  
Ruhsatlandırma Müdürü  
Registration Manager

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

29 Ocak 2025